

4. Dragoev, S. G., Staykov, A. S., Vassilev, K. P., Balev, D. K., & Vlahova-Vangelova, D. B. (2014). Improvement of the quality and the shelf life of the high oxygen modified atmosphere packaged veal by superficial spraying with dihydroquercetin solution. *International Journal of Food Science*, Volume 2014, Article ID 629062, 10 pages. <https://doi.org/10.1155/2014/629062>
5. Gateva, S., Jovtchev, G., Angelova, T., Dobrevska, A., & Mileva, M. (2022). The Anti-Genotoxic Activity of Wastewaters Produced after Water-Steam Distillation of Bulgarian Rosa damascena Mill. and Rosa alba L. Essential Oils. *Life*, 12(3), 455. <https://doi.org/10.3390/life12030455>
6. Grispoldi, L., Karama, M., El-Ashram, S., Saraiva, C., García-Díez, J., Chalias, A., ... & Cenci-Goga, B. T. (2022). A study on the application of natural extracts as alternatives to sodium nitrite in processed meat. *Journal of Food Processing and Preservation*, 46(3), e16351. <https://doi.org/10.1111/jfpp.16351>
7. Hunt, M. C., King, A., Barbut, S., Clause, J., Cornforth, D., Hanson, D., ... & Weber, M. (2012). AMSA meat color measurement guidelines. *American Meat Science Association, Champaign, Illinois USA*, 61820, 1-135.
8. Sepe, H., Faustman, C., Lee, S., Tang, J., Suman, S., & Venkitanarayanan, K. (2005). Effects of reducing agents on premature browning in ground beef. *Food Chemistry*, 93(4), 571-576. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.04.045>
9. Serikkaisai, M. S., Vlahova-Vangelova, D. B., Dragoev, S. G., Uzakov, Y. M., & Balev, D. K. (2014). Effect of dry goji berry and pumpkin powder on quality of cooked and smoked beef with reduced nitrite content. *Advance Journal of Food Science and Technology*, 6(7), 877-883.
10. Slavov, A., Spasov, H., Dinkova, R., & Denev, P. (2021). MANAGING QUALITY OF AROMATIZED WINE PREPARED BY COFERMENTATION OF GRAPE MUST AND BY-PRODUCTS OF ESSENTIAL ROSE OIL INDUSTRY. *Carpathian Journal of Food Science & Technology*, 13(3). <https://doi.org/10.34302/crfjfst/2021.13.3.4>
11. Suman, S. P., Nair, M. N., Joseph, P., & Hunt, M. C. (2016). Factors influencing internal color of cooked meats. *Meat Science*, 120, 133-144. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2016.04.006>
12. Vlahova-Vangelova, D., Balev, D., Dragoev, S., Kapitanski, B., Mihalev, K., Doncheva T. (2014). Influence of goji berry, pumpkin powder and rose petal extract on the quality of cooked sausages with reduced nitrite content. Proceedings of II International Congress, "Food Technology, Quality and Safety", October 28-30, Novi Sad, Serbia. pp. 1-6. Available at: <https://tinyurl.com/2p8fedmn>
13. Vossen, E., Utrera, M., De Smet, S., Morcuende, D., & Estévez, M. (2012). Dog rose (Rosa canina L.) as a functional ingredient in porcine frankfurters without added sodium ascorbate and sodium nitrite. *Meat Science*, 92(4), 451-457. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2012.05.010>

UDK 637.5.072
IRSTI 65.59.03

<https://doi.org/10.48184/2304-568X-2022-3-137-144>

ЕКІНШІЛІК ЕТ ШИКІЗАТЫНЫҚ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ИНГРЕДИЕНТТЕРИМЕН БАЙЫТЫЛҒАН ГЕРОДИЕТИКАЛЫҚ ЕТ ӨНІМДЕРІН ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША ЗЕРТТЕУЛЕР

¹Г.М. ТОҚЫШЕВА, ¹М.М. КАКИМОВ, ¹Н.С. МАШАНОВА, ¹Қ.Қ. МАҚАНҒАЛИ*

(¹КеАК «С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті», Қазақстан
Республикасы, 010011, Нұр-Сұлтан қ., Женіс даңғ. 62)

Автор-корреспонденттің электрондық поштасы: kmakangali@mail.ru*

Геродиетикалық ет өнімдерін өндірудің шетелдік технологияларына талдау барысында, бұл өнімдердің бағытын қалыптастыратын негізгі компоненттер: дәнекер ұлтасы ақуыздар, дәрүмендер, минералдар екенин көрсетті. Екіншілік шикізатты қолдану перспективті болып табылады, бір жағынан, ресурстарды үнемдейтін технологиялардың алғышарштары жасалады, екінші жағынан, екіншілік ет шикізатынан биологиялық белсенді ингредиенттермен байытылған ет өнімдерін өндіру мүмкіндігі жасалады. Дәнекер ұлтасы ақуыздар толыққанды ақуыздар секілді адам ағзасы үшін маңызды рол атқарады, ойткені олар табиги тағамдық талишық функцияларын орындаі алады. Сыр қарыны шырышты субонімдерге жетады, олардың құрамында көп молиерде коллаген болғандықтан табиги түрде қолданған кезде жогары беріктік сипаттамаларға ие және өзіне тән пісі мен әдмі бар. Бұл сипаттамалар оларды шикі немесе табиги түрде қолдануды қынданатады. Осылынан байланысты қарынды ет өнімдер технологиясында қолдану үшін оның ондегу технологиясын жетілдіру керек. Геродиетикалық

багыттагы шұжықтарды жасау технологиясында сыр қарындарын қолдану мақсатында физикалық-химиялық, микробиологиялық және технологиялық қасиеттері зерттелді. Зерттеу нәтижелері осы шикізатты қолдану мүмкіндігінң жоғары және олардан геродиетикалық багыттагы ет өнімдерін ондіруге барлық алғашарттар бар екендігін көрсетті.

Негізгі сөздер: субөнімдер, геродиетикалық өнімдер, тағам құндылығы, ет өнімдер, екіншілік шикізат.

ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ: Бұл зерттеуді Қазақстан Республикасы ауылшаруашылық министрлігі қаржыландауды (BR10764998).

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ГЕРОДИЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, ОБОГАЩЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ ИЗ ВТОРИЧНОГО МЯСНОГО СЫРЬЯ

¹Г.М. ТОКЫШЕВА, ¹М.М. КАКИМОВ, ¹Н.С. МАШАНОВА, ¹К.К. МАКАНГАЛИ*

(¹НАО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина», Казахстан, 010011,
г. Нур-Султан, пр. Женис 62)

Электронная почта автора-корреспондента: kmakangali@mail.ru*

Проведен анализ существующих зарубежных технологий геродиетических мясных продуктов который показал, что основными компонентами формирующими их направленность являются: соединительно-тканые белки, витамины, минеральные вещества. Использование вторичного сырья представляется перспективным, с одной стороны, создаются предпосылки ресурсосберегающих технологий, с другой стороны, становится возможным производство мясных продуктов обогащенных биологически активными ингредиентами из вторичного мясного сырья. Соединительнотканые белки, также как и полноценные белки выполняют важную роль для организма человека, так как могут выполнять функции пищевых волокон. Рубец относится к слизистым субпродуктам, которые являются коллагенсодержащими и при употреблении их в натуральном виде имеют высокие прочностные характеристики, специфические запах и вкус. Эти характеристики затрудняют их использование в сыром или натуральном виде. В этой связи, необходима разработка технологии их переработки для дальнейшего применения в промышленности. Исследовали физико-химические, микробиологические и технологические свойства говяжьего рубца с целью применения в производстве колбас геродиетического направления. Результаты исследования свидетельствуют о высоком потенциале возможности применения данного сырья и имеют все предпосылки для производства из них мясных продуктов геродиетического направления.

Ключевые слова: субпродукты, геродиетические продукты, пищевая ценность, мясные продукты, вторичное сырье.

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ: Данное исследование профинансирано Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (BR10764998).

INVESTIGATION OF PHYSICO-CHEMICAL AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF BEEF TRIPE

¹Г.М. TOKYSHEVA, ¹М.М. KAKIMOV, ¹Н.С. MASHANOVA, ¹К.К. MAKANGALI*

(¹JSC «S.Seifullin Kazakh agrotechnical University», Kazakhstan, 010011,
Nur-Sultan, Zhenis ave. 62)

Corresponding author e-mail: kmakangali@mail.ru*

The analysis of existing foreign technologies of herodietic meat products was carried out, which showed that the main components forming their orientation are: connective-woven proteins, vitamins, minerals. The use of secondary raw materials seems promising, on the one hand, prerequisites for resource-saving technologies are being created, on the other hand, it becomes possible to produce meat products enriched with biologically

active ingredients from secondary meat raw materials. Connective tissue proteins, as well as full-fledged proteins, play an important role for the human body, since they can perform the functions of dietary fibers. The scar refers to mucous by-products that are collagen-containing and, when used in their native form, have high strength characteristics, specifically smell and taste. These characteristics make it difficult to use them in raw or natural form. In this regard, it is necessary to develop a technology for their processing for further application in industry. The physicochemical, microbiological and technological properties of beef tripe were investigated for use in the production of sausages of the herodietic direction. The results of the study indicate a high potential for the possibility of using these raw materials and have all the prerequisites for the production of meat products of the herodietic direction from them.

Keywords: offal, herodietic products, nutritional value, meat products, secondary raw materials.

FUNDING INFORMATION: This study was funded by the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan (BR10764998).

Kіріспе

Тақырыпты таңдауды дәйектеу, мақсаты мен міндеттері

Қазіргі уақытта бүкіл әлемде халықтың үдемелі қартаңы жүріп жатыр. 2000 жылы дүние жүзінде 60 жастан асқан 600 миллионға жуық адам болса, ДДҰ болжамы бойынша 2025 жылы қарт адамдар саны 1,2 миллиард адамға дейін артады, 2050 жылы күтілетін саны 2 миллиард адамды құрайды [1]. Қазақстан Республикасы халқының жас құрылымында егде жастағы адамдардың үлес салмағының артуы байқалады, 2019 жылдың басында 60 жастан асқандар халықтың жалпы санының 11,6%-ын, ал 65 жастан асқандар 7,5% құрады [2].

Адамның өмір сүру тарихында тамақтану әрқашан оның денсаулығының жағдайына әсер ететін ең күшті және тұрақты фактор болды. Атақты геронтолог, академик Д.Ф. Чеботарева айтуды бойынша: «Тамақтану - өмір сүру ұзақтығын 25-40% ұзартатын іс жүзіндегі жалғыз қурал». [3].

Еліміздің егде жастағы тұрғындарының 75%-ында әртүрлі тамақтану кемшіліктері бар. Атап айтқанда, ас қорытуға байланысты аурулардың жоғары тараалуы, олардың ішінде: қан айналымы жүйесі аурулары, се-міздік, тірек-қимыл аппараты және т.б. [3, 4].

Геродиетикалық ет өнімдерін жасау тақырыбы өзекті болып табылады, өйткені ол қарттыққа тән дисфункционалдық бұзылуарды азайтып, адамның белсенді өмір сүру кезеңін ұзартуга бағытталған [5].

Қазіргі уақытта арнағы бағыттағы ет өнімдерінің ассортименті, оның ішінде қарттар мен егде жастағы адамдарға арналған өнімдер шектеулі, көбінесе сүт өнімдері мен нан өнімдерінен тұрады. [6,7].

Геродиетикалық өнімдерге қойылатын талаптарға жауап беретін рецептураларды жасау, оның құрамында жануар тектес және өсімдік тектес әртүрлі компоненттерді пайдалануды көздейді. Ет құрамындағы жануар текті ақуыздар аминқышқылдық құрамы бойынша толық болып саналады, май қыш-қылдарының көзі өсімдік майлары мен жануарлар майлары, дәрумендердің макро- және микроэлементтердің көзі өсімдік шикізаты болып табылады. Сондықтан арнағы бағыттағы өнімдер әрқашан көп компонентті болып табылады [8].

Геродиетикалық өнімдерге қойылатын талаптарға жауап беретін рецептураларды әзірлеу жануарлар мен өсімдік тектес әртүрлі компоненттерді пайдалануды қамтиды. Ет құрамындағы жануар текті белоктар аминқышқылдық құрамы бойынша толық, өсімдік майлары мен жануарлар майлары май қыш-қылдарының, өсімдік шикізаты витаминдердің, макро- және микроэлементтердің көзі болып табылады. Сондықтан мамандандырылған өнімдер әрқашан көп компонентті болып табылады [8].

Жануар тектес шикізат дәстүрлі түрде адамның тамақтануындағы толық ақуыздың негізгі көзі болып табылады. Тұтынушылардың рационында ақуызды арттырудың тиімді жолдарының бірі – екіншілік ақуыз шикізатын, атап айтқанда, құрамында коллагені бар 2-ші категориялы субөнімдерді кешенді өндесу.

Ауыл шаруашылығы жануарларын сойғанда қосалқы шикізаттар қалады, олар кейде құрамы мен қасиестіне байланысты ұтымсыз пайдаланылады. Ирі қара малды сою кезінде шырышты субөнімдер қатарына жататын карынның шығымдылығы 2,5-3,0%-дан жоғары, ол негізінен дәнекер ұлпалы ақуыздан

тұратындықтан құндылығы төмен болып келеді [9,10,11].

Қазіргі заманғы тамақтану теориясына сейкес адам ағзасы үшін толық акуыздармен қатар дәнекер ұлпаларының акуыздары маңызды рөл атқарады. Олар адамның ас қорыту жүйесінің метаболизмі мен жұмысын жақсартуға қабілетті, өйткені қасиеттері мен адам ағзасына әсері бойынша дәнекер ұлпалар тағамдық талшықтардың рөлін атқара алады. Сінімділігі төмен дәнекер ұлпалы акуыздар тағамдық талшықтар сияқты, асқазан-ішек жолдарының қабырғаларының перистальтикасын жақсартуға, ылғалдың айтарлықтай мөлшерін ұстап тұруға, улы заттарды сініруге және оларды организмнен шығаруға қабілетті болып табылады [12].

Бұл жұмыстың мақсаты ет өнімдерін өндіруде құрамында коллагені бар шикізатты пайдалану мүмкіндіктерін зерттеу болып келеді. Жұмыста сиыр қарынының функционалды және технологиялық қасиеттері зерттелді.

Зерттеу материалдары мен әдістері

Зерттеу объектісі ретінде сиыр қарыны алынды.

Акуыздың массалық үлесін ГОСТ 25011-2017 бойынша Къедаль әдісі бойынша анықталды. Еттіе оларды жалпы және акуызық емес азоттың арасындағы айырма арқылы акуызға қайта есептеуді ескере отырып анықтайды.

Майдың массалық үлесін ГОСТ 23042-2015 бойынша анықталды. Бұл әдіс еріткішпен майды экстрагирлеу, артынан ерітіндін жою және майды тұрақты массаға дейін кептіруге негізделген.

Кесте 1 – Сиыр қарынының химиялық құрамы

Көрсеткіштер атауы, өлшем бірліктері	Әдебиет деректері [9]	Накты нәтижелер
Физикалық және химиялық көрсеткіштер:		
- акуыздың массалық үлесі, %	16,61±0,15	16,3±0,17
- майдың массалық үлесі, %	3,12±0,03	4,1±0,15
- күлдің массалық үлесі, %	0,92±0,02	0,5±0,19
- ылғалдықтың массалық үлесі, %	79,80±1,25	78,8±0,36

Еттің химиялық құрамы малдың жасына, тұқымына, азықтандыруына және басқа да көптеген факторларға байланысты. Шырышты субөнімдердің құрамында толық акуыздардың мөлшері бұлшықет ұлпасымен салыстырғанда азырақ. Бірақ дәнекер ұлпанаң көп мөлшері бар коллагеннің болуы ішектің секреторлық қызметін ынталанды-

рады. Қарында дәнекер ұлпалы акуыздар жалпы акуыздың 60% құрайды.

І категориялық субөнімдердің көпшілігі емдік және алдын-алу қасиеттеріне ие. Сол себепті олар геродиетикалық тамақ өнімдерін жасау әбден жарамды. Айта кету керек, субөнімдердің сақтау мерзімі етке қаражанда әлдеқайда төмен. Субөнімдерді сақтау мерзімі: 0 ... -1°C температурада салқындастылған күйде -

Микробиологиялық зерттеулер ГОСТ Р 54354-2011 бойынша.

Органолептикалық бағалау ГОСТ 6658-

2016 бойынша, өнімдер сапасының органолеп-

тикалық көрсеткіштерінің нормативтік күжат-

тарға сәкестігін анықтауға негізделген.

Негізгі бөлім

Нәтижелер және оларды талқылау

Әдебиеттік және патенттік шолу нәти-

жесінде екіншілік ет шикізатының биоло-

гиялық белсенді ингредиенттерімен байы-

тылған геродиетикалық ет өнімдерінің тех-

нологиясын жасау мақсатында біз: сиыр

қарынын зерттедік.

Сиырдың қарыны көбіне дәнекер ұл-

палы акуыздарынан тұрады, шығымдылығы

2,5-3,0%. Дәнекер ұлпалы акуыздар толық-

канда акуыздар секілді адам ағзасы үшін

маңызды рөл атқарады, өйткені олар табиғи

тағамдық талшық функцияларын орындаі

алады. Сиыр қарыны шырышты субөнім-

дерге жатады, олардың құрамында көп мөл-

шерде коллаген болғандықтан табиғи түрде

қолданған кезде жоғары беріктік сипаттама-

ларға ие және өзіне тән иісі мен дәмі бар. Бұл

сипаттамалар оларды шикі немесе табиғи

түрде қолдануды қынданатады. Осыған

байланысты қарынды ет өнімдер техноло-

гиясында қолдану үшін оның өндеу техноло-

гиясын жетілдіру керек.

2 күн. -18°C темпе-ратурада мұздатылған субөнімдер 6 айға дейін сақталады.

Жоғарыда аталған факторлар субөнімдердің органолептикалық, физика-химиялық

және микробиологиялық көрсеткіштерін зерттеу қажеттілігін көрсетті.

7 күн бойы сақталған үлгілердің органолептикалық зерттеулерінің көрсеткіштері 2-кестеде көрсетілген.

Кесте 2 – Қарынның сақтау кезіндегі органолептикалық көрсеткіштері

Атауы		Сойыстан кейін	Сақтау уақыты, тәулік		
			1-3	4-5	6-7
Сыртқы түрі	Беткі қабатында	Таза, сәл дымқыл, біркелкі сұр-ак түсті	Таза, сәл дымқыл, біркелкі түсті, сарғыш реңктері бар сұрғылт ак	Ылғалды, күнгірт, сәл жабысқақ, біркелкі емес сұр-сары түсті	Ылғалды, жабысқақ, шырыш, күнгірт, біркелкі емес түсті, сарғыш сұр немесе сарғыш коныр
	Кескен жерінде	Аздал дымқыл, сұр-ак түсті, қарын қабырғасының құрылымы айқын	Аздал дымқыл, сұр-ак түсті, тыртық қабырғасының құрылымы айқын	Аздал дымқыл, күнгірт, сұр-сары, қарын қабырғасының тегістелген құрылымы бар	Ылғалды, күнгірт, сұр-сары, қарын қабырғасының құрылымы көрсетілмеген
Ііс		Өнімнің осы түріне тән, спецификалық	Өнімнің осы түріне тән, спецификалық	Жылдам ұшатын, шіріген реңктері бар	Айқын шірік
Консистенциясы		Серпімді, тығыз	Серпімді, тығыз	Жеткілікті серпімді емес	Жалпақ, бос, оңай жыртылады
Шырыштың болуы		Жоқ	Жоқ	Шырыштың шамалы мөлшерде болуы	Шырышты
Пісіру арқылы тексеру		Сорпа мөлдір, іісі жаңа піскен өнімге тән, бөгде дәм мен иіссіз.	Сорпа мөлдір, іісі жаңа піскен өнімге тән, бөгде дәм мен иіссіз.	Сорпа мөлдір немесе бұлғынғыр, бөтен дәмсіз және аздал сезілетін шіріген іісі бар.	Сорпа бұлғынғыр, курамында үлпек сусpenзиясы, өткір шірік іісі бар

Жүргізілген зерттеулер нәтижелері: 1 күннен кейін сорпа мөлдір, іісі балғын өнімге тән, бөгде дәм және іісі жоқ, 4-ші күні бөгде дәмі жоқ, бірақ аздал шіріген ііс сезілді, 7-ші күні өткір шірік ііс пайда болатынын көрсетті.

0 - + 4 ° С температурда 7 күн бойы сақтау кезінде қарын сынамаларындағы микрофлораның өзгеруіне зерттеулер жүргізілді.

Кесте 3 – Сақтау кезіндегі қарын сынамалары микрофлорасының өзгеруі

Көрсеткіштер атауы, өлшем бірліктері	Накты нәтижелер							
	Сақтау уақыты, тәулік							
	0	1	2	3	4	5	6	7
Микробиологиялық көрсеткіштер: - МАФАнМС, КОЕ/г	1,1*106	3,1*106	6,2*106	1,2*106	2,3*106	5,3*106	1,3*106	2,5*106
- БГКП	анықта лмады	анықтал мады	анықтал мады	анықтал ды	анықтал ды	анықтал ды	анықтал ды	анықтал ды
- Ашытқылар, КОЕ/г	анықта лмады	анықтал мады	анықтал мады	анықтал мады	1*104	1*105	1*105	1*105

Сиыр қарынының беткі қабаттарының жағынды-іздерінің микроскопиясы (бірінші күн) грам он коктарты көрсетеді. 5 күнде саны 60-қа дейін ости, 6-7 күн санауга келмеді. Микроағзалардың негізгілері таяқша тәрізді, кокты түрлері сирек кездесті. Зерттеулер көрсеткендегі, бұл сақтау кезеңдерінде ішектақшасы тобындағы ашытқылар мен бактериялар бар екендігін көрсетті.

Осылайша, жүргізілген зерттеулер осы шикізатты пайдалану мүмкіндігінің жоғары потенциалын көрсетуімен бірге олардан геродиетикалық ет өнімдерін өндіру үшін мүмкіндігі жоғары юолып табылады.

Тәжірибелік зерттеулер нәтижесінде жоғары сапалық көрсеткіштері бар модификацияланған сиыр қарынның тағамдық ақуыз ингредиентін алудың технологиялық параметрлері жасалды. Алынған мәліметтер нәтижесінде қарынның құрамында ақуыздардың мөлшері жоғары болуына байланысты консистенциясы қатты және тығыз болып келеді. Осыған байланысты бұл шикізатты геродиет-

тарлық өнімдерді өндіруде пайдалану үшін функционалдық және технологиялық қасиеттерін жақсарту мақсатында жұмсарту технологиясын жасау қажет. Шырышты субөнімдерді модификациялаудың кең тарағандары: механикалық, физикалық, химиялық және биотехнологиялық әдістер. Модификациялаудың үнемді және тиімді әдістерінің бірі химиялық әдіс болып табылады. Өнімдерді қышқыл немесе сілті ерітінділерімен өңдеу. Сілтімен өңдеу майлардың сабындалтуын тудыруы мүмкін, бұл жағымсыз дәмге экеледі. Эксперименттік зерттеулердің осы кезеңінде біз қышқылдық әдісті таңдағық.

Сиырдың қарының модификациясының параметрлерін негіздеу үшін бастапқы кезеңде тамақ өнеркәсібінде кеңінен қолданылатын сірке қышқылы таңдалды. Сірке қышқылы ерітіндісіне қарынды қанша және қалай ұстау параметрлерін нақтылау үшін қарынның органолептикалық көрсеткіштері зерттелді.

Кесте 4 – Қарынның органолептикалық көрсеткіштері

Ірке қышқылы, %	Ұстая ұзактығы, мин					
	60		80		100	
	Түсі	Иісі	Түсі	Иісі	Түсі	Иісі
1	Сұр-жасыл	Балғын қарынның өткір иісі	Сұр-жасыл	Балғын қарынның өткір иісі	Сұр	Балғын қарынның өткір иісі
2	Сұр-жасыл	Балғын қарынның өткір иісі	Сұр	Қарынның иісі, сәл қышқыл	Сұр-ақ	Қарынның иісі, сәл қышқыл
3	Сұр	Қарынның иісі, сәл қышқыл	Сұр-ақ	Қарынның иісі, сәл қышқыл	Сұр-ақ	Айқын қышқыл иіс
4	Сұр-ақ	Айқын қышқыл иіс	Сұр-ақ	Откір қышқыл иіс	Сұр-ақ	Откір қышқыл иіс
5	Сұр-ақ	Айқын қышқыл иіс	Сұр-ақ	Откір қышқыл иіс	Сұр-ақ	Откір қышқыл иіс

Сірке қышқылының концентрациясы (1-5%) органикалық қышқылдарды тамақ өнеркәсібінде пайдалану деректері негізінде таңдалды. Қышқылдың концентрациясы 3%-дан жоғары және өңдеу уақыты 80 минуттан асқанда, тұрақты қышқыл иіс пайда болды.

Модификацияланған қарынның жоғары ылғалдылығы сақтау мерзімін айтартықтай қыскартады. Осыған байланысты, модификацияланған қарынды құрғақ ұнтақталған ингредиент алу үшін кептіру онтайлы шешім болып табылады.

Қорытынды

Геродиетикалық ет өнімдерін өндірудің шетелдік технологияларына талдау барысында, бұл өнімдердің бағытын қалыптастыратын негізгі компоненттер: дәнекер ұлпалы ақуыздар, дәрүмендер, минералдар екенін көрсетті. Екіншілік шикізатты қолдану перспективті болып табылады, бір жағынан, ресурстарды үнемдейтін технологиялардың алғышарттары жасалады, екінші жағынан, екіншілік ет шикізатынан биологиялық

белсенді ингредиенттермен байытылған ет өнімдерін өндіру мүмкіндігі жасалады.

Егде жастағы адамдардың тұтынушылық талғамдарының мониторингі бойынша карт адамдардың шайнау қабілетінің әртүрлілігіне байланысты өндірілетін геродиетикалық тамак өнімдердің консистенциясы шайнау қабілетінің жасына байланысты өзгерістерін ескеру маңыздылығын көрсетеді.

Сиыр қарынының сынаамаларында микрофлораның өзгеруіне зерттеулер 0 - + 4°C температурада 7 күн сақтау кезінде жүргізді. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, балғын қарынының сақтау мерзімі 5 күнге дейін. Қарынды модификациялаудың химиялық әдісі тандалды. Сір қышқылының әртүрлі концентрациясы мен эсер ету уақытының ұзақтығына байланысты қарының органолептикалық сипаттамалары зерттелді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБІЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Тюзиков И.А., Калиниченко С.Ю. Саркопения: помогут ли только протеиновое питание и физическая активность? Роль половых стероидных гормонов в механизмах регуляции синтеза мышечного белка // Вопр. диетологии. 2017. Т. 7, № 2. – С. 41–50.

2. Демографический ежегодник Казахстана. Агентство Республики Казахстан по статистике: Нур-Султан, 2019- 220с..

3. Чеботарев Д.Ф. Гериатрия в клинике внутренних болезней// Киев: Здоровья 1977 г. – 303 с.

4. Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2020-2025 годы. Электронный ресурс: <https://adilet.zak.kz>. Дата обращения: 20.04.2022

5. Касьянов Г.И., Запорожский А.А., Юдина С.Б. // Технология продуктов для людей пожилого и преклонного возраста. Ростов н/Д.: Изд-во «MarT», 2001. – 187 с.

6. Устинова А.В. Перспективы развития производства и рынка продуктов здорового питания// Мясные технологии. — 2010. - №5. - С.6-10

7. Хабибуллин Р.Э., Хусаинова Х.Р., Минивалеева Э.И., Решетник О.А. Влияние экзогенной молочнокислой ферментации на функционально-технологические свойства говяжьих субпродуктов 2 категории // Вестник Казанского технологического университета, 2011. – №16. – С.18-20.

8. Новикова Маргарита Владимировна, Дудник Татьяна Львовна. Разработка специализированных продуктов геродиетического питания // Сервис в России и за рубежом. 2012. – №2. - С.3-10.

9. Лукьяненко И. В. Классификация мяса / Сочная буженина и зельц. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2014. -224 с.

10. Davidson A., Jaine T. The Oxford Companion to Food. -3rd ed.. -Oxford University Press, 2014. – 921 p.

11. Семенова А.А., Козырев И.В., Миттельштейн Т.М. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32244-2013 «Субпродукты мясные обработанные» // Все о мясе, 2015. — № 2. — С. 18–20.

12. Баженова Баяна Анатольевна, Хамнаева Нина Ивановна, Бадмаева Ирина Ильинична, Гарифуллина Елена Сергеевна, Данилов Андрей Михайлович. Получение пищевого ингредиента из модифицированного говяжьего рубца // Все о мясе. 2016, №6. — С. 56–60.

13. ГОСТ 25011-2017 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка. М.: Стандартинформ, 2018.-16с.

14. ГОСТ Р 55573-2013 Мясо и мясные продукты. Определение кальция атомно-абсорбционным и титриметрическим методами. М.: Стандартинформ, 2014.-18с.

15. ГОСТ Р 55484-2013 Мясо и мясные продукты. Определение содержания натрия, калия, магния и марганца методом пламенной атомной абсорбции. М.: Стандартинформ, 2014.-12с.

16. ГОСТ 33424-2015 Мясо и мясные продукты. Определение магния методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии. М.: Стандартинформ, 2016.-10с.

17. ГОСТ Р 55482-2013 Мясо и мясные продукты. Метод определения содержания водорастворимых витаминов. М.: Стандартинформ, 2014.-10с.

18. ГОСТ 32307-2013 Мясо и мясные продукты. Определение содержания жирорастворимых витаминов методом высоко-эффективной жидкостной хроматографии. М.: Стандартинформ, 2014.-15с.

REFERENCES

1. Tjuzikov I.A., Kalinichenko S.Ju. Sarkopenija: pomogut li tol'ko proteinovoe pitanie i fizicheskaja aktivnost'? Rol' polovyh steroidnyh gormonov v mehanizmakh reguljacii sinteza myshechnogo belka // Vopr. dietologii. 2017. T. 7, № 2. S. 41–50.

2. Demograficheskij ezhegodnik Kazahstana. Agentstvo Respubliki Kazahstan po statistike. Nur-Sultan. 2019.

3. Chebotarev D.F. Geriatrija v klinike knutrennih boleznej// Kiev: Zdorov'ja 1977 g., 303 s.

4. Gosudarstvennaja programma razvitiya zdravoohranenija Respubliki Kazahstan «Densaulyk» na 2020-2025 gody

5. Kas'janov G.I., Zaporozhskij A.A., Judina S.B. // Tehnologija produktov dlja ljudej pozhilogo i preklonnogo vozrasta. Rostov n/D.: Izd-vo «MarT», 2001. S. 187.

6. Ustinova A.B. Permspektivy razvitiya proizvodstva i rynka produktov zdorovogo pitanija// Mjasnye tehnologii. — 2010. - №5. - S.6-10
7. Habibullin R. Je., Husainova H. R., Minivaleeva Je. I., Reshetnik O. A. Vlijanie jekzogennoj molochnokisloj fermentacii na funktsional'no-tehnologicheskie svojstva govjazh'ih subproduktov 2 kategorii // Vestnik Kazanskogo tehnologicheskogo universiteta. 2011. №16.
8. Novikova Margarita Vladimirovna, Dudnik Tat'jana L'vovna Razrabotka specializirovannyh produktov gerodieticheskogo pitanija // Servis v Rossii i za rubezhom. 2012. №2. - S.3-10
9. Luk'janenko I. V. Klassifikacija mjasja / Sochnaja buzhenina i zel'c. - Har'kov: Klub semejnogo dosuga, 2014. -224 s.
10. Davidson A., Jaine T. The Oxford Companion to Food. -3rd ed.. -Oxford University Press, 2014. - 921 p.
11. Emenova A.A., Kozyrev I.V., Mittel'shtejn T.M. Mezhgosudarstvennyj standart GOST 32244-2013 «Subprodukty mjasnyeobrabortanne» // Vse o mjasje, 2015. — № 2. — S. 18–20.
12. Bazhenova Bajana Anatol'evna, Hamnaeva Nina Ivanovna, Badmaeva Irina Il'inichna, Garifulina Elena Sergeevna, Danilov Andrej Mihajlovich Poluchenie pishhevogo ingredienta iz modifitsirovannogo govjazh'ego rubca // Vse o mjasje. 2016. №6. — S. 56–60.
13. GOST 25011-2017 Mjaso i mjasnye produkty. Metody opredelenija belka. 2018. – 16 p.
14. GOST R 55573-2013 Mjaso i mjasnye produkty. Opredelenie kal'cija atomno-absorbcionnym i titrimetricheskim metodami, 2014. – 18 p.
15. GOST R 55484-2013 Mjaso i mjasnye produkty. Opredelenie soderzhanija natrija, kalija, magnija i marganca metodom plamennoj atomnoj absorbcii, 2014. – 12 p.
16. GOST 33424-2015 Mjaso i mjasnye produkty. Opredelenie magnija metodom plamennoj atomno-absorbcionnoj spektrometrii, 2016. – 10 p.
17. GOST R 55482-2013 Mjaso i mjasnye produkty. Metod opredelenija soderzhanija vodorastvorimyh vitaminov, 2014. - 10 p.
18. GOST 32307-2013 Mjaso i mjasnye produkty. Opredelenie soderzhanija zhironastvorimyh vitaminov metodom vysokojeffektivnoj zhidkostnoj hromatografii. 2014. - 15 p.

UDK 637.5.072
IRSTI 65.59.03

<https://doi.org/10.48184/2304-568X-2022-3-144-150>

II КАТЕГОРИЯЛЫ СУБӨНІМДЕРДЕН АҚУЫЗ ГИДРОЛИЗАТЫН АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ

¹Г.М. ТОҚЫШЕВА, ¹М.М. КАКИМОВ, ¹Т.Ч. ТУЛТАБАЕВА,
¹Н.С. МАШАНОВА, ¹К.К. МАҚАНГАЛИ*

(¹ КеАК «С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті»,
Қазақстан Республикасы, 010011, Нұр-Сұлтан қ., Женіс дүңг. 62)
Автор-корреспонденттің электронды поштасы: kmakangali@mail.ru*

Мақалада зерттеу обьектісі – малды сою кезіндегі қалатын екіншілік шикізат II категориялы субөнімдер. Олар ақуыздың таптырмас көзі және гидролизаттарын атуға қажетті басқа да бірқатар қасиеттерге ие. Сонымен қатар, мұндай екіншілік шикізатты пайдалану перспективалы болып көрінеді, ойткені бұл жағдайда, бір жағынан, аз қалдықты технологияларды жасау үшін алғышарттар жасалады, ал екінші жағынан, қоректік заттардың оңтайтын қатынасында комбинациялардан өнімдерді өндіруге мүмкіндік береді. Зерттеу нағтижелері II категориялы субөнімдердің құрамында глициннің, аланиннің, глутамин қышқылының, сериннің, сондай-ақ пролиннің жоғары молиерін көрсетеді, яғни бұл негізінен коллагеннің құрамында көздесетін амин қышқылдар. Коллаген гидролизаты сирақтарды ферменттавті гидролиздеу арқылы алынды. Компоненттердің дайындаудың ерекшеліктерін ескере отырып, ақуызды гидролизат алуының технологиялық сұйбысы ұсынылады.

Негізгі сөздер: субөнімдер, геродиетикалық өнімдер, тағамдық құндылығы, ет өнімдері, екіншілік шикізат.

ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ: Бұл зерттеуді Қазақстан Республикасы ауылшаруашылық министрлігі қаржыландырды (BR10764998).